

**Supplemental Material: A Gauge Invariant Multiscale
Approach to Magnetic Spectroscopies in Condensed Phase:
General Three-Layer Model, Computational Implementation
and Pilot Applications**

Filippo Lipparini

Scuola Normale Superiore, Piazza dei Cavalieri, 7 I-56126 Pisa, Italy

Chiara Cappelli^a

Scuola Normale Superiore,

Piazza dei Cavalieri, 7 I-56126 Pisa,

Italy and Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale,

Università di Pisa,

via Risorgimento, 35 I-56126 Pisa, Italy

Vincenzo Barone

Scuola Normale Superiore,

Piazza dei Cavalieri,

7 I-56126 Pisa, Italy

^a Corresponding author: e-mail: chiara.cappelli@sns.it

TABLE I. Absolute chemical shifts (ppm) of pyrimidine in vacuo and solvent shifts (ppm) as obtained with different solvent representations. For the cluster approaches, two explicit water molecules are included at the QM, classical MM and FQ levels of theory, respectively, possibly including the PCM embedding (/PCM). The RMS and Max errors are reported with respect to QM/PCM.

Atom	Vacuum	QM	QEq	FQ	PCM	QM/PCM	QEq/PCM	FQ/PCM
C2	14.35	3.20	1.20	1.34	0.71	3.11	1.31	1.52
N1	-78.09	15.47	12.45	14.35	11.55	21.55	18.76	21.26
C4	18.82	-0.87	-0.98	-1.07	-1.49	-1.43	-1.77	-1.92
C5	57.56	-1.34	-0.89	-1.01	-2.20	-3.00	-2.62	-2.77
H-C4	22.62	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.10	-0.13	-0.13
H-C2	22.01	0.23	0.17	0.17	0.09	0.19	0.15	0.17
H-C5	24.30	-0.26	-0.16	-0.18	-0.40	-0.56	-0.47	-0.50
RMS	-	5.73	13.02	8.45	15.19	-	1.61	0.42
Max	-	6.08	9.09	7.20	9.99	-	2.79	1.60